ORIENTAÇÕES PARA SUINOCULTORES PARA PREVENÇÃO DA PESTE SUÍNA AFRICANA

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO

PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL

- A Peste Suína Africana (PSA) é uma doença altamente contagiosa que afeta os suínos domésticos e asselvajados. A PSA não existe no Brasil e precisamos mantê-la longe daqui. Apesar de não representar um perigo para a saúde humana, pode levar a severas perdas econômicas para você e toda a suinocultura nacional. Não existe vacina ou tratamento contra a PSA. Adote rigorosas medidas preventivas em sua granja para proteger seus suínos e os de seus vizinhos. Não deixe a PSA entrar no Brasil e não dissemine a doença!

MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO

- Notifique todo caso de animal com suspeita de PSA (vivo ou morto) ao serviço veterinário oficial. Até a chegada do médico veterinário, mantenha os animais doentes em isolamento.
- Adote as medidas sanitárias e de higiene para prevenção de doenças na sua criação. Evite adquirir animais doentes ou de origem não confiável.
- Não alimente os suínos com restos de comida não fervidos (60°C por 30 minutos), especialmente os que contenham carne suína.
- Evite o contato direto e indireto dos suínos domésticos com os asselvajados. Mantenha seus suínos cercados e protegidos.
- Adote medidas de quarentena para os suínos que entrarem na granja.
- Limpe e desinfete qualquer equipamento compartilhado com outras granjas ou com caçadores de suínos asselvajados.
- Evite receber visitas na granja. Se receber, evite que tenham contato direto ou indireto com os suínos.
- Os sinais clínicos da PSA são: aumento de mortalidade; perda de apetite; fraqueza; emagrecimento; diarreia; vômito; febre alta; suínos amontoados; conjuntivite; pneumonia; aborto; manchas avermelhadas na pele, ponta das orelhas, focinho, cauda, peito e abdômen. Se detectar um animal com suspeita da doença:

  – Avise imediatamente o serviço veterinário oficial;
  – Isole o suíno com suspeita;
  – Não envie animais para o abate ou para qualquer finalidade;
  – Não venda nenhum produto de origem animal de sua propriedade.

ORIENTAÇÕES PARA GRANJAS COMERCIAIS DE SUÍNOS

- Notifique todo caso suspeito de PSA (vivo ou morto) ao serviço veterinário oficial.
- Tenha certeza de que todos os trabalhadores e visitas conheçam as normas de biossegurança.
- Limpe e desinfete todo o material e equipamentos que entram e saem da granja.
- Evite o contato direto e indireto dos suínos domésticos com os suínos asselvajados (javalis). Mantenha as instalações dos suínos com cercas em bom estado de conservação.
- Adote medidas de quarentena para os suínos antes de entrarem na granja.
- Não alimente seus suínos com restos de alimentos não tratados ou que contenham carne de suínos.

PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA PROTEÇÃO DA CRIAÇÃO DE SUÍNOS

SEGREGAÇÃO

- Estabeleça e mantenha barreiras físicas para limitar as oportunidades de disseminação da doença por meio de pessoas, animais ou materiais. Quando aplicadas corretamente, as medidas de segregação previnem a contaminação e a infecção de várias doenças nos suínos, entre elas a PSA.

1) Proteja as entradas da propriedade. Mantenha barreiras periféricas sólidas e armazene adequadamente a água e os alimentos para prevenir o contato com suínos asselvajados e roedores.

2) Controle rigorosamente o movimento de funcionários e de visitas na entrada e saída da propriedade.

3) Controle o ingresso de suínos implementando medidas de quarentena.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO

- Todos os materiais (veículos, equipamentos, etc.) que entram ou saem do estabelecimento devem ser limpos e desinfetados com rigor para eliminar a sujeira visível e inativar os patógenos existentes.

1) Tome banho ou lave as mãos antes e depois de visitar um estabelecimento com suínos.

2) Utilize roupas e calçados específicos na granja.

3) Limpe os veículos e calçados. É importante eliminar todos os restos visíveis de matéria orgânica antes da desinfecção.

4) Limpe e desinfete as instalações entre os lotes de suínos.

5) Use um desinfetante aprovado contra o vírus da PSA. Respeite as concentrações e o tempo de contato recomendado.

MÉTODOS DE ALIMENTAÇÃO

- Não alimente seus suínos com resíduos ou sobras de alimentos não tratados. Ferver os restos de alimentos por pelo menos 30 minutos antes de fornecer aos suínos.

Fonte: OIE e Mapa

Saiba mais:
gov.br/agricultura

#peste**suina**africana

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL